

付表 4.1 薬品中毒の応急処置

原 因	薬 品	処 置 法
薬品を飲込んだ 場合		専門医に連絡する。 吐かせる（腐食性薬品の場合は禁忌）。 牛乳、とき卵、水、茶、またはメリケン粉、 デンプンなどの水乳濁液を飲ませる。
	強 酸	酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、 牛乳などの水乳濁液を飲ませる。
	強アルカリ	1～2%酢酸、レモンジュースなどを飲ま せる。
	水 銀	水またはスキムミルクでといた卵白を与え る。
	硝 酸 銀 メタノール	食塩水を飲ませる。 1～2% NaHCO_3 で胃洗浄。
ガスを吸入した 場合		新鮮な空気中へ連れ出す。安静にし、保温 する。場合によっては人工呼吸を行う。
	シ ア ン	直ちに亜硝酸アミルをかがせる。
	塩 素	アルコールをかがせる。
	臭 素	薄いアンモニア水をかがせる。
	ホ ス ゲ ン アンモニア	酸素吸入する。 酸素吸入する。
目に入った場合		直ちに流水で15分間洗う。
皮膚に付着した 場合		大量の流水で皮膚を十分に洗う。
	強 酸	水洗後、飽和 NaHCO_3 水で洗う。
	強アルカリ	水洗後、2%酢酸で洗う。
	フェノール	アルコールでこすり落とす。
	リ ン	水は使わない。1% CuSO_4 で処理する。
やけどした場合		とにかく流水(10～15℃)で最低30分間以上 冷やす。